ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ НА ЭКСТРЕМУМ

В начале рассмотрим случай поиска локального минимума функции *двух* переменных, поскольку уже для $n=2$ все существенные отличия от одномерной задачи можно легко продемонстрировать.

Пусть дана дважды непрерывно дифференцируемая в некоторой области $\Omega \subseteq E^2$ с ОНБ функция $f(x,y)$. Выясним, при каких условиях эта функция имеет в точке $\left\| \begin{matrix} x^* \\ y^* \end{matrix} \right\| \in \Omega$ локальный минимум. Дадим

Определение 1. Будем говорить, что функция $f(x,y)$ имеет в точке $\left\| \begin{matrix} x^* \\ y^* \end{matrix} \right\|$ *строгий локальный минимум*, если существует $\overset{\circ}{U}_\varepsilon$ - проколотая окрестность, такая, что для *любой* точки $\left\| \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right\| \in \overset{\circ}{U}_\varepsilon$ выполнено неравенство

$$f(x,y) > f(x^*,y^*). \qquad (1)$$

Понятно, что проверить выполнение условия определения 1 для всех точек окрестности $\overset{\circ}{U}_{\varepsilon}$ невозможно. Поэтому необходимо получить условия существования экстремума, проверка которых практически реализуема.

В некоторых случаях, удается преобразовать запись функции $f(x,y)$ к виду, в котором выполнение неравенства (1) очевидно или легко проверяется. Например, функцию $f(x,y)=x^4-x^2y+y^2$ можно записать так:

$$f(x,y)=x^4-x^2y+\frac{y^2}{4}+\frac{3y^2}{4}=\left(x^2-\frac{y}{2}\right)^2+\left(\frac{y\sqrt{3}}{2}\right)^2.$$

Откуда следует, что точка $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}=\begin{Vmatrix} 0 \\ 0 \end{Vmatrix}$ есть точка локального минимума. Впрочем, подобная ситуация есть исключение, а не правило.

Более удобным способом использования определения 1 является оценка знака разности $f(x,y)-f(x^*,y^*)$ для точек окрестности $\overset{\circ}{U}_{\varepsilon}$ при помощи *формулы Тейлора.*

Формулу Тейлора для функции $f(x,y)$ в точке $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$, как известно, можно записать в виде

$$f(x,y)=f(x^*,y^*)+df+\frac{1}{2}d^2f+o(\rho^2), \tag{2}$$

где $\rho=\sqrt{dx^2+dy^2}$, $dx=x-x^*$ и $dy=y-y^*$, а дифференциалы df и d^2f соответственно равны

$$df=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy, \qquad d^2f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dxdy+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2.$$

В двух последних формулах частные производные вычислены в точке $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$.

Из (2) получаем, что

$$f(x,y)-f(x^*,y^*)=df+\frac{1}{2}d^2f+o(\rho^2), \tag{3}$$

Здесь отметим, что, согласно теореме Тейлора (об остаточном члене в форме Пеано) первое слагаемое в правой части (3) в силу дважды непрерывной дифференцируемости функции $f(x,y)$, имеет порядок малости $\rho=\sqrt{dx^2+dy^2}$. Второе слагаемое в правой части - порядок малости $\rho^2=dx^2+dy^2$.

Это означает, что в достаточно малой окрестности точки $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$ знак приращения $f(x,y)-f(x^*,y^*)$ определяется знаком величины $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy$, который может быть *любым* в силу линейной зависимости df от dx и dy.

Иначе говоря, если grad $f(x,y) \neq o$ и для некоторого вектора $\begin{Vmatrix} dx \\ dy \end{Vmatrix}$ мы имеем $f(x,y) - f(x^*,y^*) > 0,$ то для вектора $\left(- \begin{Vmatrix} dx \\ dy \end{Vmatrix} \right)$ мы обязательно будем иметь, что $f(x,y) - f(x^*,y^*) < 0,$ так как производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ от значений dx и dy не зависят. Значит, у непрерывно дифференцируемой функции $f(x,y)$ в точках, где grad $f(x,y) \neq o$, экстремума (т.е. минимума или максимума) быть не может. Заметим, что точки, в которых grad $f(x,y) \neq o$, принято называть *стационарными точками* для функции $f(x,y)$.

В итоге мы приходим к следующему *необходимому* условию существования экстремума:

Если функция $f(x,y)$ **имеет экстремум в точке** $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$**, то**

либо grad $f(x^*,y^*) = o$**,**

либо *градиент в этой точке не существует***.**

Это необходимое условие не является достаточным. Пример: $f(x,y) = xy$. Здесь в начале координат градиент есть нулевой вектор, а экстремума нет.

Пусть теперь мы рассматриваем только точки, в которых grad $f(x,y)=o$. В этом случае знак разности $f(x,y)-f(x^*,y^*)$ будет совпадать со знаком второго слагаемого в правой части (3), т.е.

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2. \qquad (4)$$

В формуле (4) значения производных вычислены в фиксированной точке $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$ и не зависят от значений dx и dy. Для простоты записей будем обозначать эти значения так: $A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $B=\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Напомним, что матрица $\begin{Vmatrix} A & B \\ B & C \end{Vmatrix}$ называется *матрицей Гессе*.

Тогда можно утверждать, что знак разности $f(x,y)-f(x^*,y^*)$ совпадает со знаком квадратичной формы

$$Adx^2 + 2Bdxdy + Cdy^2. \qquad (5)$$

Если квадратичная форма $Adx^2 + 2Bdxdy + Cdy^2$. *положительно определенная*, то в точке $\begin{Vmatrix} x^* \\ y^* \end{Vmatrix}$ функция $f(x,y)$ будет иметь *строгий локальный минимум*, а, если эта форма *отрицательно определена*, то - *строгий локальный максимум*. Наконец, если форма не имеет знаковой определенности(как строгой, так и нестрогой), то экстремума гарантировано нет. Оставшиеся возможные случаи будут требовать дополнительного исследования.

Итак, мы пришли к достаточным условиям вида:

Если у дважды непрерывно дифференцируемой функции $f(x,y)$ в *стационарной* точке квадратичная форма (5) *положительно* определена, то $f(x,y)$ имеет в этой точке *строгий локальный минимум*.

Если у дважды непрерывно дифференцируемой функции $f(x,y)$ в *стационарной* точке квадратичная форма (5) *отрицательно определена*, то $f(x,y)$ имеет в этой точке *строгий локальный максимум*.

Если у дважды непрерывно дифференцируемой функции $f(x,y)$ в *стационарной* точке квадратичная форма (5) не имеет *знаковой определенности*, то $f(x,y)$ не имеет в этой точке *строгого локального экстремума*.

Заметим, что, например, *первое достаточное условие не является необходимым*. Контр-пример: $f(x,y) = x^4 + y^4$. Здесь в начале координат есть строгий минимум, а строгой положительности нет.

Напомним теперь, доказываемые в курсе линейной алгебры, методы исследования квадратичной формы (5) на наличие или отсутствия знаковой неопределенности.

1) *Метод Лагранжа*. Он сводится к построению диагонального (или канонического) базиса методом выделения полных квадратов, т.е. базиса, в котором коэффициент B у квадратичной формы (5) равен нулю.

2) *Критерий Сильвестра*. Этот критерий утверждает, что для положительной определенности формы (5) необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнялись неравенства $A>0$ и $\det\begin{Vmatrix} A & B \\ B & C \end{Vmatrix}>0$.

   Для отрицательной определенности формы (5) необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнялись неравенства $A<0$ и $\det\begin{Vmatrix} A & B \\ B & C \end{Vmatrix}>0$.

3) *Диагонализация матрицы квадратичной формы в евклидовом пространстве*. Этот метод основан на теореме о том, что в базисе из собственных векторов самосопряженного преобразования, имеющего в ОНБ матрицу вида $\begin{Vmatrix} A & B \\ B & C \end{Vmatrix}$, матрица такого преобразования диагональная, причем на ее главной диагонали стоят собственные значения этого преобразования.

Пример 1. В E^2 исследовать на экстремум функцию $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$.

Решение: 1) Найдем вначале для бесконечно дифференцируемой функции $f(x,y)$ все ее стационарные точки, т.е. точки, подозрительные на экстремум. Эти точки находятся из *необходимого* условия

$$\operatorname{grad} f(x,y)=o \quad \text{или} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y=0, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x=0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \left[\begin{matrix} \left\|\begin{matrix}1\\1\end{matrix}\right\| \\ \left\|\begin{matrix}0\\0\end{matrix}\right\| \end{matrix}\right. .$$

2) Проверим теперь выполнение *достаточных* условий в стационарных точках. Строим матрицу Гессе $\left\| \begin{matrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{matrix} \right\| = \left\| \begin{matrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{matrix} \right\|$.

В первой стационарной точке матрица Гессе будет $\left\| \begin{matrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{matrix} \right\|$. Для нее выполняется критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы (5). Значит в точке $\left\| \begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix} \right\|$ у функции строгий локальный минимум.

Во второй стационарной точке матрица Гессе равна $\left\| \begin{matrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{matrix} \right\|$. Для нее не выполняется достаточное условие знаковой определенности квадратичной формы (5). В точке $\left\| \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right\|$ у экстремума нет, поскольку в малой окрестности начала координат $f(x,y) = -3dxdy + dx^3 + dy^3$ и при $dx = dy$ имеем $\Delta f = -3dx^2 + 2dx^3 < 0$, а при $dx = -dy$ имеем $\Delta f = 3dx^2 - 2dx^3 > 0$.







Пример 2. В E^2 исследовать на экстремум функцию

$$f(x,y)=3x^2y+y^3-12x-15y\,.$$

Решение: 1) Для бесконечно дифференцируемой функции $f(x,y)$ найдем все ее стационарные точки, т.е. точки, подозрительные на экстремум. Эти точки находятся из *необходимого* условия

$$\operatorname{grad} f(x,y)=o \quad \text{или} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}=6xy-12=0, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=3x^2+3y^2-15=0 \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{cases} xy=2, \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$$

Откуда получаем четыре точки, подозрительные на экстремальность

$$\begin{Vmatrix} 1 \\ 2 \end{Vmatrix}, \begin{Vmatrix} -1 \\ -2 \end{Vmatrix}, \begin{Vmatrix} 2 \\ 1 \end{Vmatrix}, \begin{Vmatrix} -2 \\ -1 \end{Vmatrix}.$$

2) Проверим выполнение *достаточных* условий в стационарных точках.

Матрица Гессе имеет вид $\begin{Vmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} 6y & 6x \\ 6x & 6y \end{Vmatrix}.$

Эта матрица симметрическая и в ОНБ может рассматриваться как матрица самосопряженного преобразования. Которая, в свою очередь, в ОНБ из собственных векторов имеет диагональный вид. Причем на главной диагонали стоят собственные значения.

Результаты применения метода приведем в следующей таблице

Стац. точка	**Матрица Гессе**	**Знаковая определенность**	**Характ. уравн. и собств. значения**	**Экстремум?**
$\begin{Vmatrix}1\\2\end{Vmatrix}$	$\begin{Vmatrix}12 & 6\\6 & 12\end{Vmatrix}$	Положительная	$(12-\lambda)^2-36=0$ $\lambda_1=6,\quad \lambda_2=18$	Строгий минимум
$\begin{Vmatrix}-1\\-2\end{Vmatrix}$	$\begin{Vmatrix}-12 & -6\\-6 & -12\end{Vmatrix}$	Отрицательная	$(-12-\lambda)^2-36=0$ $\lambda_1=-6,\quad \lambda_2=-18$	Строгий максимум
$\begin{Vmatrix}2\\1\end{Vmatrix}$	$\begin{Vmatrix}6 & 12\\12 & 6\end{Vmatrix}$	Нет	$(6-\lambda)^2-144=0$ $\lambda_1=-6,\quad \lambda_2=18$	Нет
$\begin{Vmatrix}-2\\-1\end{Vmatrix}$	$\begin{Vmatrix}-6 & -12\\-12 & -6\end{Vmatrix}$	Нет	$(-6-\lambda)^2-144=0$ $\lambda_1=6,\quad \lambda_2=-18$	Нет

Пример 3. В E^2 исследовать на экстремум $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$.

Решение: 1) Необходимое условие экстремума $\operatorname{grad} f(x,y) = o$ или

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4(x-y) = 0, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 4(x-y) = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 4x^3 + 4y^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -x .$$

Откуда, подставив в первое уравнение системы, получим $4x^3 - 8x = 0$.

Значит, стационарных точек три: $\begin{Vmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{Vmatrix}, \begin{Vmatrix} -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{Vmatrix}, \begin{Vmatrix} 0 \\ 0 \end{Vmatrix}$.

2) Проверяем достаточные условия. Имеем матрицу Гессе следующего вида $\begin{Vmatrix} 12x^2-4 & 4 \\ 4 & 12y^2-4 \end{Vmatrix}$. В первых двух стационарных точках справедливо равенство $x^2=y^2=2$ и потому в этих точках матрица Гесса $\begin{Vmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{Vmatrix}$. Следовательно, в первых двух точках мы имеем строгие локальные минимумы.

В третьей стационарной точке - в начале координат - матрица Гессе равна $\begin{Vmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{Vmatrix}$ и квадратичная форма (5) является отрицательно полуопределенной. Значит, ни одно из трех достаточных условий *не применимо*.

Воспользуемся тем, что изменение значения исследуемой функции в начале координат определяется следующей формулой:

$$\Delta f(x,y)=dx^4+dy^4-2(dx-dy)^2.$$

В этом случае, выходя из начала координат по направлению $dx=dy$, мы получим, что $\Delta f(x,y)>0$, а выходя по направлению $dx=-dy$, будем иметь $\Delta f(x,y)=2dx^4-8dx^2<0$ при достаточно малых $|dx|$. Это означает, что начало координат не является экстремальной точкой для исследуемой функции .

Пример 4. В E^2 исследовать на экстремум $f(x,y) = 4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y + 1$.

Решение: 1) Необходимое условие экстремума $\operatorname{grad} f(x,y) = o$ или

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = 8x - 4y + 4 = 0, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = -4x + 2y - 2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 2x - y + 1 = 0 .$$

Множество стационарных точек неограниченно и есть прямая в E^2.

2) Проверяем достаточные условия. Имеем матрицу Гессе, одинаковую для всех стационарных точек $\begin{Vmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 2 \end{Vmatrix}$. Значит, в каждой стационарной точке квадратичная форма (5) является положительно полуопределенной и ни одно из трех достаточных условий *не применимо*.

В этой ситуации можно воспользоваться тем, что исследуемая функция может быть записана так:

$$f(x,y) = (2x - y)^2 + 2(2x - y) + 1 = (2x - y + 1)^2 .$$

Откуда следует, что каждая точка прямой $2x - y + 1 = 0$ является точкой минимума функции $f(x,y)$, но нестрогого, поскольку в любой ее окрестности имеются другие точки с тем же значением $f(x,y)$.

Пример 5. В E^2 исследовать на экстремум $f(x,y)=1-\sqrt{x^2+y^2}$.

Решение: 1) Необходимое условие экстремума утверждает, что либо $\operatorname{grad} f(x,y)=o$, либо он не существует.

Нетрудно видеть, что в любой точке, кроме начала координат, вектор $\operatorname{grad} f(x,y)$ имеет вид

$$\begin{Vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} -\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{Vmatrix}. \qquad (6)$$

Среди таких точек стационарных нет, поскольку длина вектора градиента для них равна единице.

Остается рассмотреть точку начало координат. в ней вектор градиента не существует, поскольку не существую пределы, являющиеся частными производными по x и y. Действительно, из курса математического анализа известно, что пределы вида

$$\lim_{dx\to 0}\frac{f(0+dx,0)-f(0,0)}{dx}=\lim_{dx\to 0}\frac{-\sqrt{dx^2}}{dx}=\lim_{dx\to 0}\frac{-|dx|}{dx}$$

и

$$\lim_{dy\to 0}\frac{f(0,0+dy)-f(0,0)}{dy}=\lim_{dy\to 0}\frac{-\sqrt{dy^2}}{dy}=\lim_{dy\to 0}\frac{-|dy|}{dy}$$

не существуют. Заметим, что использование формул (6) для обоснования недифференцируемости исследуемой функции в начале координат, является неверным.

Поскольку применение критериев экстремума с данной задаче невозможно, воспользуемся непосредственно определением. Имеем следующую оценку знака изменения значения исследуемой функции при произвольном отклонении аргументов от начала координат:

$$f(0+dx,0+dy)-f(0,0)=1-\sqrt{dx^2+dy^2}-1=-\sqrt{dx^2+dy^2}<0\quad\forall dx,\,dy,$$

из которой следует, что начало координат является точкой строго максимума.

Пример 6. В E^2 исследовать на экстремум функцию $u(x,y)$, заданную *неявно* условием $F(x,y,u)=1-x^2-y^2-u^2=0$.
(7)

Решение: 1) Найдем производные функции $u(x,y)$, заданной неявно:

имеем $u_x^{'}=-\frac{F_x^{'}}{F_u^{'}}$, $u_y^{'}=-\frac{F_y^{'}}{F_u^{'}}$, где

$$F_x^{'}=-2x,\ F_y^{'}=-2y,\ F_u^{'}=-2u.$$

Тогда, в силу необходимых условий экстремальности

из $\begin{cases} u_x^{'}=-\frac{x}{u}=0 \\ u_y^{'}=-\frac{y}{u}=0 \end{cases}$ следует, что точка $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ подозрительная на экстремум.

2) Для применения достаточных условий найдем матрицу Гессе в подозрительной точке, получим

$$\begin{Vmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} \\ u''_{yx} & u''_{yy} \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} -\frac{1}{u} + x\frac{u'_x}{u^2} & x\frac{u'_y}{u^2} \\ y\frac{u'_x}{u^2} & -\frac{1}{u} + y\frac{u'_y}{u^2} \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} -\frac{1}{u} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{u} \end{Vmatrix}. \qquad (8)$$

С другой стороны из (7) имеем, что в точке $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ переменная $u = \pm 1,$ то есть уравнение (7) в окрестности этой точки задает две различные функции.

Используя достаточные условия экстремума, из (8) получаем, что у одной из этих функций с $u = -1$ имеем минимум, а при $u = 1$ - максимум.

К данному заключению можно было также придти, заметив, что в окрестности точки $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ из уравнения (7) следует, что либо $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, либо $u = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Пример 7. Пусть непрерывная функция $F(x)$ имеет в точке x^* локальный экстремум. Верно ли утверждение: в этом случае найдется такая окрестность точки x^*, для которой $F(x)$ монотонна как в правой, так и в левой полуокрестности этой точки? Ответ обосновать.

Решение: Нет, неверно. Пример: непрерывная функция

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{если } x=0,\\ x^2\left(2+\cos\dfrac{1}{x}\right), & \text{если } x\neq 0\end{cases}$$

имеет в точке $x^*=0$ минимум, но не является монотонной в любой полуокрестности этой точки.